

STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM

Rozprawa doktorska powstała w oparciu o monotematyczny cykl czterech artykułów opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych indeksowanych w bazie PubMed i uwzględnionych na liście Journal Citation Reports oraz znajdujących się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa. Artykuły zostały opublikowane w recenzowanych czasopismach o łącznym współczynniku wpływu 9,732 oraz 320 punktów ministerialnych.

Jednym z elementów tej pracy doktorskiej było przetłumaczenie na język polski oraz zwalidowanie odpowiednich narzędzi diagnostycznych, służących do oceny szeroko pojętego samopostrzegania. W cyklu trzech prac walidacyjnych wykazano przydatność zastosowania przetłumaczonych narzędzi diagnostycznych, tj. COPS, AAI, BSQ-34 i FAS do oceny psychometrycznej polskojęzycznych pacjentów.

W czwartej pracy pt. "To inject or to reject? The body image perception among aesthetic dermatology patients" przy zastosowaniu czterech, wcześniej przygotowanych, nowych kwestionariuszy oraz dwóch dodatkowych, zwalidowanych w przeszłości, dokonano oceny psychometrycznej osób poddających się zabiegom dermatologii estetycznej. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, częstość występowania BDD w grupie pacjentów poddających się zabiegom estetycznym była wysoka (7,28% - 11,17%). Wyraźne zaniepokojenie kształtem własnego ciała zaraportowało 9,47% osób, a niską samoocenę 11,65% badanych. Jednym z najbardziej zaskakujących wniosków z badania była duża zależność statusu materialnego z wszystkimi badanymi elementami, tj. podatnością na BDD, niskim docenianiem własnego ciała, słabym obrazem własnego ciała oraz niską samooceną. Być może powinno stanowić do podstawę do dalszych badań oraz do szerzenia świadomości w tych środowiskach. Kolejna konkluzja z pracy, którą warto podkreślić to brak związku zadowolenia z wcześniejszych zabiegów z żadną z powyżej badanych zmiennych, co było sprzeczne z pierwotnymi założeniami pracy. Korzyści z wybranych zabiegów estetycznych u niektórych pacjentów z zaburzeniami oceny własnego ciała, coraz częściej podawane w piśmiennictwie na pewno są tematem wartym przeprowadzenia dalszej diagnostyki.

Ocena psychometryczna pacjentów poddających się zabiegom estetycznym jest to temat warty przeprowadzenia bardziej szczegółowych, wielośrodkowych badań na większej liczbie pacjentów, z zastosowaniem grupy kontrolnej oraz z większym zaangażowaniem populacji męskiej. Zadowolenie z leczenia estetycznego uzależnione od rodzaju wykonywanego zabiegu również mogłoby być przedmiotem dalszych badań.

Podsumowując, bardzo istotne jest zwiększenie rozpoznawalności zaburzeń oceny własnego ciała wśród pacjentów dermatologii estetycznej oraz zaznajomienie profesjonalistów z dostępnymi narzędziami diagnostycznymi. Ocena psychometryczna każdego pacjenta przed

zabiegami estetycznymi powinna odgrywać istotną rolę w planowaniu leczenia. Multidyscyplinarne podejście i współpraca lekarzy dermatologii estetycznej, psychiatrów i psychologów mogłyby być standardem przyszłości w określaniu granicy między patologią, a normą w kontekście zabiegów estetycznych.

STRESZCZENIE W JEZYKU ANGIELSKIM

This doctoral dissertation was based on a monothematic series of four articles published in international scientific journals indexed in the PubMed database and listed in Journal Citation Reports also located on the list of scientific journals of the Ministry. The articles have been published in peer-reviewed journals with a total impact factor of 9,732 and 320 ministerial points.

One of the elements of this doctoral thesis was translation and validation of diagnostic tools appropriate for assessing broadly understood self-perception. In a series of three validation works, four newly created diagnostic tools, i.e., COPS, AAI, BSQ-34 and FAS, were proven adequate for the psychometric assessment of Polish-speaking patients.

In the fourth work entitled 'To inject or to reject? The body image perception among aesthetic dermatology patients' psychometric assessment of people undergoing aesthetic dermatology treatments was carried out with use of four previously prepared, new questionnaires and two additional questionnaires, validated in the past. As previously assumed, the prevalence of BDD in the group of patients undergoing aesthetic procedures was high (7.28% - 11.17%). Significant body shape concern was reported by 9.47% of people, and low self-esteem by 11.65% of the respondents. One of the most surprising study conclusions was the strong relationship between the material status and all the examined elements, i.e., susceptibility to BDD, low body appreciation, poor body image and low self-esteem. Perhaps it should be the indication for further researches and for spreading awareness in those environments. Another conclusion from the work that is worth emphasizing is the lack of relationship between satisfaction with previous treatments and any of the above-mentioned variables, which is contrary to the original assumptions of the work. The growing reports about the benefits of selected aesthetic procedures in some groups of BDD patients are certainly a topic worth further investigation.

Psychometric assessment of patients undergoing aesthetic procedures is a subject worth conducting more detailed, multi-center studies on a larger number of patients, using a control group and with greater involvement of the male population. Satisfaction with aesthetic treatment depending on the type of procedure performed could also be the subject of further research.

To sum up, it is very important not only to increase the recognition of body image disorders and self-esteem disruptions among aesthetic dermatology patients but also to familiarize professionals with the available diagnostic tools. Psychometric assessment of each patient before aesthetic procedures should play an important role in planning the treatment. A multidisciplinary approach and cooperation of aesthetic doctors, psychiatrists and

psychologists could be the standard of the future in defining the borderline between pathological behaviors and innocent beautification in the context of aesthetic procedures.

